

Checkliste der Limikolenbestimmung

Kenngrößen zur Bestimmung der Gruppe

- **Grösse** (grobe Schätzung, z.B. im Vergleich zu Lachmöwe, Star, etc.)
- **Schnabellänge** (verglichen mit Kopf- oder Beinlänge)
- **Schnabelform** (gerade, aufgeworfen, nach unten gebogen)
- **Beinlänge**
- **Verhalten** (Bewegung bei der Nahrungssuche, Schwanzwippen, etc.)

Kenngrößen zur Bestimmung der Art

- **Stimme**
- **Gefieder** (Mauser und Kleiderfolge, Alter: adult oder juvenil, besonders im Herbst bei Gruppen mit gut unterscheidbaren Pracht-, Jugend- und Schlichtkleidern)
- **Grösse** (nur bei direktem Vergleich mit bekannten Arten genau, man beachte innerartliche Variabilität sowie Grössentäuschung bei Beobachtung durch Fernrohr)
- **genaue Schnabelform und -länge**
- **Schnabelfarbe** (Vorsicht bei Verschmutzung!)
- **Beinfarbe** (bei manchen Arten variabel, Vorsicht bei Verschmutzung)
- **Struktur** (allgemeine Gestalt, Beinlänge stehend und im Flug, relative Flügel- und Schwanzlänge/Hand-schwingen-, Flügel-, Schwanzprojektion)
- **Verhalten** (Bewegung bei Nahrungssuche, Schwanzwippen etc.)